

Stéphane Simon

CHIRURGIEN DENTISTE
Exercice limité à l'endodontie

Les suites opératoires des traitements endodontiques



A l'issue d'un traitement quel qu'il soit, il n'est pas anormal de ressentir un inconfort voire quelques douleurs.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR ?

La douleur post-opératoire doit en tout état de cause demeurer supportable. Elle peut-être plus forte durant les premières heures, période où l'anesthésie se dissipe.

Si le fait de serrer vos dents vous déclenche une douleur, **recontactez votre praticien afin qu'il supprime les interférences, car sinon les douleurs vont s'aggraver.**

SUITES DE L'ANESTHESIE



Les effets de l'anesthésie **durent en général 2 à 3 heures** après le moment de l'injection. Chez certains patients, les effets peuvent se prolonger quelques heures, mais doivent diminuer régulièrement. Si le lendemain de l'intervention, l'anesthésie persiste, **recontactez votre praticien rapidement.**

OEDÈME (gonflement)

Dans quelques cas, un gonflement peut survenir après un traitement canalair. Il est associé ou non à une douleur importante.

Dans ce cas, contactez votre praticien le plus rapidement possible afin qu'il puisse adapter votre prescription médicamenteuse. IL EST IMPORTANT DE NE PAS VOUS AUTO-MÉDIQUER.

ALIMENTATION



Aucune précaution particulière n'est à prendre après un traitement endodontique, sauf si nous vous l'indiquons de vive voix.

Stéphane Simon

CHIRURGIEN DENTISTE
Exercice limité à l'endodontie

Les suites opératoires des traitements endodontiques



A l'issue d'un traitement quel qu'il soit, il n'est pas anormal de ressentir un inconfort voire quelques douleurs.

HYGIÈNE BUCCALE



Dès le premier jour, vous pouvez vous brosser les dents tout à fait normalement. La gencive autour de la dent traitée peut-être sensible car elle a été irritée pendant le traitement. **N'hésitez pas à la nettoyer tout doucement, voire à faire des bains de bouche pour accélérer la cicatrisation.**

ET APRES VOTRE TRAITEMENT ?

Le traitement qui a été réalisé pour le moment ne concerne que la partie interne de la dent. La restauration de la partie externe sera faite par votre praticien traitant dans la continuité et dans les meilleurs délais.

SUIVI DE LA GUERISON

Un kyste ou autre lésion met plusieurs mois, voire plusieurs années à guérir. Il faut donc assurer un suivi avec des radiographies.

C'est ce qui fait l'objet des visites de contrôles effectués à 6 et 12 mois.

Si avant ces contrôles des signes cliniques apparaissent (douleur, sensation curieuse, gonflement, etc.) n'hésitez pas à contacter votre praticien, car une persistance ou une réapparition de la douleur est en général un signe d'inefficacité du traitement.

